

## Risque cardiaque de citalopram à dose élevée

Le 13 octobre 2011  
Pour diffusion immédiate

**OTTAWA** - Santé Canada évalue l'innocuité cardiaque de l'antidépresseur d'ordonnance citalopram. De nouvelles données semblent indiquer qu'à forte dose (60 mg/jour), le médicament pourrait avoir des effets sur l'activité électrique du cœur. La modification de l'activité électrique pourrait entraîner une arythmie cardiaque grave, voire mortelle.

À l'heure actuelle, Santé Canada examine les données disponibles et évalue le besoin de modifier la posologie recommandée. Le Ministère prendra les mesures appropriées en fonction des résultats de son examen et collaborera entre autres avec les entreprises pour mettre à jour l'information posologique. De nouveaux renseignements sur l'innocuité seront communiqués aux professionnels de la santé et à la population dès que possible, une fois l'examen terminé.

Le citalopram sert à traiter la dépression et appartient à une classe de médicaments appelés ISRS (inhibiteurs spécifiques du recaptage de la sérotonine). Selon l'information posologique en vigueur au Canada, la dose recommandée pour les adultes est de 20 mg/jour. Certaines personnes qui ne réagissent pas à cette dose se font prescrire 40 ou même 60 mg/jour.

Au Canada, le citalopram est offert en comprimés de 10, 20, 30 et 40 mg. Il est commercialisé sous le nom Celexa et plusieurs autres noms génériques (qui contiennent tous le terme « citalopram », sauf les produits génériques « ran-citalo » et « CTP-30 »).

Le patient qui s'interroge ou qui s'inquiète au sujet du citalopram devrait consulter un professionnel de la santé. Il ne faut pas cesser de prendre du citalopram ni modifier la dose sans avoir consulté un professionnel de la santé, puisqu'un arrêt soudain peut causer des effets secondaires comme des étourdissements, une sensation d'agitation ou d'anxiété, des difficultés de concentration, des rêves anormaux, des nausées ou des vomissements.

Toute personne traitée au citalopram doit consulter un médecin immédiatement si elle présente l'un des symptômes suivants : arythmie cardiaque, essoufflement, étourdissements et évanouissement. Le risque de souffrir d'arythmie cardiaque est plus élevé si vous avez un problème cardiaque sous-jacent, ou des antécédents de faibles taux sanguins de potassium ou de magnésium.

L'étiquetage du médicament, ou monographie de produit, contient des renseignements importants sur la posologie et l'innocuité à l'intention des professionnels de la santé et des patients. Il est possible de consulter ces monographies en faisant une recherche dans la [Base de données sur les produits pharmaceutiques](#) de Santé Canada.

### Pour signaler un effet indésirable

Pour signaler un effet indésirable présumé à un produit de santé, veuillez communiquer avec le Programme Canada Vigilance de Santé Canada au 1-866-234-2345 (sans frais), ou remplir un [Formulaire de déclaration de Canada Vigilance](#) et nous le faire parvenir de l'une des façons suivantes :

Télécopieur : 1-866-678-6789

Internet : [www.santecanada.gc.ca/medeffet](http://www.santecanada.gc.ca/medeffet)

## Risque cardiaque de citalopram à dose élevée

Poste ([Procurez-vous une étiquette préaffranchie](#)):  
Programme Canada Vigilance  
Direction des produits de santé commercialisés  
Ottawa (Ontario), indice de l'adresse 0701E  
K1A 0K9